



Д Р О Н Т

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ
РЕСУРСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ



Choristites sp. (Солигаличский район),
Карбон (С)



Choristites sp. (морена), Карбон (С)

Тип: Плеченогие (*Brachiopoda*)

Класс: *Rhynchonellata*

Отряд: Спирифериды (*Spiriferida*)

Род: *Choristites*

Раковина средняя или большая, двояковыпуклая, обычно неравностворчатая, разнообразного очертания. Длина смычного края равна наибольшей ширине или короче ее. Арея (площадка между окончанием макушки и замочным краем на раковине некоторых брахиопод) всегда с обрубленными или скошенными концами, края ее обычно параллельны. Дельтирий (отверстие треугольной формы у брахиопод, через которое выходит ножка моллюска) не прорезает макушку до носика. Синус большей частью развит, углубленный, реже плоский, или в виде желобка. Седло обособлено не всегда. Вся раковина ребристая. Ребра гладкие. В течение всей своей жизни брахиоподы *Choristites* прикреплялись

своей ножкой к твердому субстрату (при возможном атрофирование ножки фиксировались в субстрате уже донными отложениями).