



Д Р О Н Т

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ
РЕСУРСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ



Keplerites sp., Юрский период (J)



Keplerites sp. (Кологривский район),
Юрский период (J)

Тип: Моллюски (*Mollusca*)

Класс: Головоногие моллюски (*Cephalopoda*)

Подкласс: Аммониты (*Ammonoidea*)

Семейство: Космоцератиды (*Kosmoceratidae*)

Род: Кеплериты (*Keplerites*)

Keplerites – умеренно эволюционный аммонит из нижнего келловоя (верхняя часть средней юры), входящий в состав *Stephanoceratoidea*. Внутренние обороты тонко-ребристые и имеют уплощенную или бороздчатую вентральную часть, внешний оборот имеет округлую вентральную часть с гладкими ребрами, которые пересекаются из стороны в сторону без перерыва. Раковины *Keplerites* были украшены не только ребрами, но и бугорками-шипами. Бугорки и шипы на раковине были и у всех их потомков-космоцератид. Кепплерит был назван Ноймайром и Улигом в 1892 году. Этот род

При перепечатке текстовой информации и фотографий ссылка на сайт обязательна

также был обнаружен на Аляске, в Британской Колумбии, Мадагаскаре и России.