



Д Р О Н Т

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ
РЕСУРСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ



Степная (Среднеазиатская) черепаха

Класс: Пресмыкающиеся (Reptilia);

Отряд: Черепахи (Testudines);

Семейство: Сухопутные черепахи (Testudinidae);

Род: Европейские сухопутные черепахи (Testudo);

Вид: Среднеазиатская черепаха, или степная черепаха *Testudo horsfieldii* Gray, 1844

Распространение:

Встречается на всей Средней Азии, в южных районах Казахстана, в Северо-Восточном Иране, Афганистане, в северо-западных районах Индии и Пакистана.

Характеристика:

Длина черепахи в среднем 15–20 см. Панцирь среднеазиатской черепахи невысокий, округлый, желтовато-бурого цвета, с расплывчатыми темными пятнами. Карапакс разделён на 13 роговых щитков, пластрон – на 16, по бокам карапакса расположены 25 щитков. Самки обычно заметно крупнее самцов. На передних лапах среднеазиатской черепахи по 4 пальца, а на бедрах задних расположены роговые бугорки. Обитает в глинистых и песчаных пустынях с зарослями полыни, тамариска или саксаула. Питается растениями пустыни, бахчевыми культурами, всходами многолетних трав и кустарников, ягодами и падалицей фруктов в садах.