



Д Р О Н Т

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ
РЕСУРСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ



Обыкновенный уж

Класс: Пресмыкающиеся (Reptilia);

Отряд: Чешуйчатые (Squamata);

Семейство: Ужеобразные (Colubridae);

Род: Ужи (Natrix);

Вид: Обыкновенный уж *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758) Stejneger, 1907

Распространение:

Широко распространён в Евразии от Рейна на западе до Байкала и прилежащих областей Монголии на востоке и от Фенноскандии на севере до северо-восточной Италии, Балканского полуострова, Малой Азии, Закавказья и северного Ирана на юге. В бассейне Рейна, в северо-восточной Италии и в Баварии и Тироле пролегают зоны

контакта обыкновенного ужа с другим видом рода, *Natrix helvetica*, с которым он может образовывать гибриды.

Характеристика:

Крупные змеи длиной тела до 120 см. Хвост в 3–5 раз короче. Внешне обыкновенные ужи обычно легко отличаются от других змей «жёлтыми ушами» – ярко выраженными отметинами на голове, чаще жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. В редких случаях отметины могут быть слабо выражены или отсутствовать. Самки по размеру больше самцов, иногда достигают 2 метров, но чаще всего – не больше метра. Питается в основном живыми лягушками, грызунами и реже рыбой. Уж неагрессивен. При виде человека он спасается бегством.