



Д Р О Н Т

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ  
РЕСУРСНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
НАУЧНАЯ  
ТЕРРИТОРИЯ



**Такырная круглоголовка**

**Класс:** Пресмыкающиеся (Reptilia);

**Отряд:** Чешуйчатые (Squamata);

**Семейство:** Агамовые (Agamidae);

При перепечатке текстовой информации и фотографий ссылка на сайт обязательна

**Род:** Круглоголовки (*Phrynocephalus*);

**Вид:** Такырная круглоголовка *Phrynocephalus helioscopus* Pallas, 1771

**Распространение:**

Встречается на территории России (от Астраханской и южной части Волгоградской областей до крайнего юга Алтайского края), в Казахстане, Туркмении, Узбекистане, в северо-западном Китае, в северо-восточном Иране, юго-западной Монголии, на Севере Таджикистана, в Киргизии.

**Характеристика:**

Общая длина достигает 7 см. Хвост относительно короткий, его длина не превышает длину тела. У данного вида окраска спины зависит от цвета субстрата. На тёмных почвах круглоголовки бурые или тёмно-серые, тогда как на песках и известковых почвах они светло-серого или пепельного цвета. Также отличительной особенностью является то, что у них на поверхности спины, в области шеи, два овальных красных или розовых пятна с голубым или синим окаймлением. Активна днём. Прячется в норах песчанок, тушканчиков, собственных норах, которые устраивает у подножия кустарников. Питается насекомыми.