



Д Р О П Т

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ
РЕСУРСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ



Степная агама

Класс: Пресмыкающиеся (Reptilia);

Отряд: Чешуйчатые (Squamata);

Семейство: Агамовые (Agamidae);

Род: Агамы-трапелусы (Trapelus);

Вид: Степная агама *Trapelus sanguinolentus* (Pallas, 1814)

Распространение:

Степная агама распространена в пустынях и полупустынях Восточного Предкавказья (Россия), Южного Казахстана, Средней Азии, Северном и Северо-Восточном Иране, Северном Афганистане, Северо-Западном Китае. В Средней Азии северная граница ареала проходит от восточного побережья Каспийского моря немного южнее реки Эмбы, огибает с юга Мугоджарские горы и через низовья

реки Тургай и долину среднего течения реки Сарысу опускается к северному побережью озера Балхаш, достигая далее предгорий Тарбагатая. По долинам рек проникает в предгорья Тянь-Шаня и Памиро-Алая, встречаясь в окрестностях городов Ош в Киргизии и Чубек в Юго-Западном Таджикистане.

Характеристика:

Общая длина степной агамы не превышает 30 см, при длине туловища с головой до 12 см, хвост в 1,3–2 раза длиннее тела. Масса тела до 45 г (по другим данным до 62 г). Взрослые агамы, как и большинство пустынных пресмыкающихся, окрашены в серый или песочно-серый цвет. Но это только в состоянии покоя и при пониженной температуре. Если животное сильно нагреется на солнце не приметная окраска разительно меняется: горло, бока, грудь, брюхо и конечности самцов становятся черно-синими, а на сером фоне спины также появляются ярко-синие пятна, хвост же становится ярко-желтым. Обитает в песчаных, глинистых и каменистых пустынях и полупустынях, предпочитая места с кустарниковой или полудревесной растительностью. Питается в основном разнообразными насекомыми, а также пауками, многоножками, мокрицами и сочными частями растений.