



Д Р О Н Т

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ
РЕСУРСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ



Камышница

Класс: Птицы (Aves)

Отряд: Журавлеобразные (Gruiformes)

Семейство: Пастушковые (Rallidae)

Род: Камышницы (Gallinula)

Вид: Камышница *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758)

Распространение:

В Европе они гнездятся почти повсеместно, за исключением высокогорных районов Альп, Скандинавского полуострова севернее 66° северной широты и севера России. В Российской Федерации северная граница ареала проходит примерно вдоль 60° северной широты – через Карельский перешеек, Новгородскую, Вологодскую области севернее Рыбинского водохранилища, Татарстан,

При перепечатке текстовой информации и фотографий ссылка на сайт обязательна

Башкортостан, Омскую область и Алтайский край. Птица также встречается на Дальнем Востоке в Приморском крае, а также на Сахалине и южных Курильских островах. В Азии птица также распространена в Индии и на юго-востоке вплоть до Филиппин. В Африке птицу можно встретить лишь на юге континента, Мадагаскаре и на западе в районе Конго и Алжира. В Северной Америке птица гнездится на юге и востоке США, а также в Мексике. Камышницы также широко распространены в Центральной Америке, островах Карибского моря и в Южной Америке от Бразилии до Аргентины и Перу.

Характеристика:

Небольшая птица длиной 27–31 см. Оперение буровато-чёрное или грифельно-серое с синим оттенком на шее, узкими белыми полосками по бокам и белым с чёрной полосой подхвостьем. Клюв относительно короткий, треугольной формы, ярко-красный в основании и жёлтый либо зеленоватый на конце. На лбу имеется пятно ярко-красной кожи. Места обитания связаны с природными или искусственными пресноводными (редко солоноватыми) водоёмами с берегами. Рацион очень разнообразен и включает в себя как животную, так и растительную пищу. Камышницы моногамны. Гнездо чаще всего устраивается на небольшом возвышении посреди водоёма либо на его краю.