



Д Р О Н Т

ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ
РЕСУРСНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ



Стерлядь

Класс: Костные рыбы (Osteichthyes)

Отряд: Осетрообразные (Acipenseriformes);

Семейство: Осетровые (Acipenseridae);

Род: Осетры (Acipenser);

Вид: Стерлядь *Acipenser ruthenus* Linnaeus, 1758.

Распространение:

Глобально обитает в реках бассейна Чёрного, Азовского и Каспийского морей, в бассейне рек Северная Двина, Обь, Енисей, проникла в бассейн Ладожского и Онежского озёр. Выпущена в реки: Неман, Западную Двину, Онегу, Печору, Амур, Оку, а также в ряд водохранилищ.

Характеристика:

При перепечатке текстовой информации и фотографий ссылка на сайт обязательна

Среди других осетровых отличается наиболее ранним наступлением половой зрелости: самцы впервые нерестятся в возрасте 4–5 лет, самки – 7–8 лет. Плодовитость 4 тысячи – 140 тысяч икринок. Нерестится в мае, обычно в верховьях рек. Взрослые особи обычно достигают длины 40–60 см и массы 0,5–2 кг. Взрослые особи питаются преимущественно личинками хирономид, мелкими моллюсками и другими беспозвоночными (мизиды, гаммариды). Осенью, в сентябре, собирается на глубоких участках рек (ямах), где проводит всю зиму в малоподвижном состоянии, не питаясь. Зарегулирование рек обычно улучшает условия откорма стерляди, но ухудшает условия её воспроизводства. Предельный возраст стерляди около 30 лет. Ценная промысловая рыба. Объект прудового и озёрного разведения.